

**Teste final do curso de DPOC - 2014**

---

- 1 - Para a estratificação do nível de gravidade da DPOC não interessa o seguinte sintoma:
- A. Tosse matinal
  - B. Dispneia
  - C. Expectoração
  - D. Febre
- 2 – Para definir que um doente com DPOC tem risco elevado de exacerbação interessa considerar
- A. Exploração funcional respiratória
  - B. História Clínica
  - C. Gasimetria
  - D. A + B
  - E. A+B + C
- 3- A radiografia do tórax faz parte da avaliação do doente com DPOC para:
- A. Despiste de cancro do pulmão
  - B. Diagnóstico imagiológico de DPOC
  - C. Diagnóstico de enfisema centrolobular
  - D. Satisfação das expectativas do doente
- 4 - Os broncodilatadores de ultra longa duração de acção (24 horas) são a 1ª opção terapêutica da DPOC por:
- A. Melhoria da capacidade de exercício
  - B. Redução do risco de exacerbações
  - C. Restauração da função respiratória para valores normais.
  - D. A + B
  - E. A + B + C
- 5 - Dos broncodilatadores de ultra longa duração de acção (24 horas), apenas 1 é recomendado em monoterapia em todos os estádios da doença:
- A. Tiotrópio
  - B. Indacaterol
  - C. Salmeterol
  - D. Formoterol
  - E. Nenhuma das anteriores

**Chave:**

**1D, 2D, 3A, 4D, 5A**